

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Coryzalia®

nyelvalatti bevont tabletták
Homeopátiás gyógyszer

Mielőtt elkezdni szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Coryzalia nyelvvalatti bevont tabletták és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Coryzalia nyelvvalatti bevont tabletták szedése előtt
3. Hogyan kell szedni a Coryzalia nyelvvalatti bevont tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Coryzalia nyelvvalatti bevont tablettát tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. Milyen típusú gyógyszer a Coryzalia nyelvvalatti bevont tabletták és milyen betegségek esetén alkalmazható?

A Coryzalia nyelvvalatti bevont tabletták homeopátiás gyógyszer, mely a homeopátiás gyakorlatban felső légúti hurut, megfázás okozta fejfájás, orrnyálkahártya-gyulladás, orrgarat-gyulladás, nátha, szénanátha esetén alkalmazható.

Növényi és ásványi eredetű anyagok felhasználásával készül.

2. Tudnivalók a Coryzalia nyelvvalatti bevont tabletták szedése előtt

Ne szedje a Coryzalia nyelvvalatti bevont tablettát

- ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére,
- ha a terápia közben túlérzékenységi tünetek jelentkeznek.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

A homeopátiás kezelés kezdetén a betegség tünetei átmenetileg felerősödhetnek. Ezek átmenetiek és veszélytelenek.

Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel orvosát, mielőtt elkezdni szedni ezt a gyógyszert. *Cukorbetegség* esetén figyelembe kell venni, hogy a készítmény tablettánként kb. 270 mg szacharózt tartalmaz.

A homeopátiás gyógyszerek alkalmazásának időtartama alatt nem szabad illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) terméket (pl. cukorka, stb.) fogyasztani, és intenzív illatú fogkrémet használni. A kezelés ideje alatt aromás anyagokat tartalmazó kenőcsöt (pl. kámforos) sem szabad alkalmazni, mivel ezek jelentős mértékben képesek befolyásolni a homeopátiás gyógyszer hatását.

Nem a javallat szerinti, ill. a gyógyszer hosszantartó szedése esetén, vagy a betegtájékoztatóban feltüntetett adagok túllépése esetén nem kívánt hatások (*ún. gyógyszervizsgálati tünetek*) léphetnek fel, amelyek új, eddig nem tapasztalt panaszok formájában jelentkezhetnek.

Amennyiben a tünetek nem javulnának, esetleg rosszabbodnának, vagy új tünetek jelennek meg, orvossal történő konzultáció szükséges.

Gyermekeknek 6 éves kor alatt ellenjavallt.

Egyéb gyógyszerek és a Coryzalia nyelvvalatti bevont tabletták

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is.

A Coryzalia nyelvvalatti bevont tabletták egyidejű bevétele étellel és itallal

A homeopátiás gyógyszerek alkalmazásának időtartama alatt nem szabad illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) terméket (pl. étel, ital, stb.) fogyasztani.

Terhesség, szoptatás és termékenység

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészeivel.

A készítmény hatóanyagainak a termékenységet befolyásoló hatására, valamint a terhesség és szoptatás időszaka alatt történő alkalmazásának biztonságosságára vonatkozóan nincsenek klinikai adatok, ezért a készítmény szedése ezen élethelyzetekben nem ajánlott.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A Coryzalia nyelvvalatti bevont tabletták javallat szerinti szedés során nem

befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

3. HOGYAN KELL SZEDNI A CORYZALIA NYELVALATTI BEVONT TABLETTÁT?

A Coryzalia nyelvvalatti bevont tablettát mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény ajánlott adagja:

Ha az orvos másképp nem rendeli ajánlott adagja **6 éves kor feletti gyermekek, serdülőkoriak és felnőttek** számára: az első napon óránként 1-1 tablettát (max. 12 db).

A második naptól kezdve az alkalmazás gyakorisága csökkenthető a tünetek enyhülésének megfelelően: 2-3 óránként 1-1 tablettát.

A Coryzalia nyelvvalatti bevont tablettákat étkezés előtt fél órával kell bevenni és hagyni, hogy a nyelv alatt lassan széteszen.

Amennyiben a panaszok a kezelés ellenére tartósan (3 napon túl) fennállnak, javulás nem következik be, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez.

Ha az előírtnál több Coryzalia nyelvvalatti bevont tablettát vett be

Kérjen tanácsot orvosától vagy gyógyszerészétől.

Ha elfelejtette bevenni a Coryzalia nyelvvalatti bevont tablettát

Ha elfelejtette bevenni az előírt adagot, pótolja azt mielőbb. Ha az elfelejtett adag pótlása és a következő előírás szerinti adag bevétele nagyjából azonos időpontra esik, folytassa a gyógyszer szedését az eredetileg előírt módon. Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így a Coryzalia nyelvvalatti bevont tablettát is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Nyálfolyás, túlérzékenységi reakció előfordulhat, melynek gyakorisága nem ismert.

A mellékhatások előfordulása esetén a tablettát szedését átmenetileg abba kell hagyni. A Coryzalia nyelvvalatti bevont tablettát alkalmazásával kapcsolatban eddig más, nemkívánatos hatást, mellékhatást nem jelentettek.

Mellékhatások bejelentése

Ha Önnek bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.

A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az alábbi elérhetőségeken:

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Postafiók 450 H-1372 Budapest

www.ogyei.gov.hu

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. HOGYAN KELL A CORYZALIA NYELVALATTI BEVONT TABLETTÁT TÁROLNI?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Legfeljebb 25°C-on, fénytől, közvetlen napsugárzástól és erős elektromágneses hatásoktól védve, az eredeti csomagolásban tárolandó.

A dobozon és a buborékcsoomagoláson feltüntetett lejárati idő után ne szedje a Coryzalia nyelvvalatti bevont tablettát. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Ne szedje a Coryzalia nyelvvalatti bevont tablettát, ha azon a bomlás jelei láthatók.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A CSOMAGOLÁS TARTALMA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Coryzalia nyelvvalatti bevont tablettát

- A készítmény hatóanyagai:

Allium cepa	C3	0,333 mg
Atropa belladonna	C3	0,333 mg
Sabadilla officinalis	C3	0,333 mg
Kalium bichromicum	C3	0,333 mg
Gelsemium sempervirens	C3	0,333 mg
Pulsatilla vulgaris	C3	0,333 mg

- Egyéb összetevők: Szacharóz (kb. 270 mg), talkum, arabmézga, magnézium-sztearát, zselatin, fehér méhviasz, karnaubaviasz.

Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás

Kerek, fehér, fényes, mindkét oldalán domború, szagtalan bevont tablettát. Törési felülete fehér színű.

2 x 20 db tablettát PVC/Alu buborékcsoomagolásban és dobozban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó

BOIRON - 2 avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - France

Nyilvántartási száma OGYI-HG - 107/01

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma:

2013. december